

Tumore del colon-retto in Svizzera

2017- 2021 (ICD-10 C18-20)

- Il tumore intestinale è il terzo tumore più frequente in Svizzera, sia tra le donne che tra gli uomini. Ogni anno ne sono colpiti circa 4500 e 1600 ne muoiono.
- I fattori di rischio sono l'età, i fattori genetici, i fattori legati allo stile di vita (ad esempio la mancanza di attività fisica, una alimentazione malsana) e le malattie infiammatorie croniche dell'intestino.
- Il tumore intestinale si sviluppa lentamente. Le persone colpite spesso non notano nulla per molto tempo. Gli esami di screening sono quindi importanti.
- Negli ultimi 20 anni, il rischio di sviluppare un tumore intestinale e di morire per questa malattia è diminuito costantemente.
- Il tumore intestinale è una malattia che si manifesta principalmente in età avanzata. Circa il 41% delle persone colpite ha più di 75 anni al momento della diagnosi.
- Cinque anni dopo la diagnosi, il 69% delle persone affette da cancro è ancora in vita, rispetto alla popolazione generale. Queste relative possibilità di sopravvivenza sono notevolmente migliorate negli ultimi decenni.

Nuovi casi all'anno

Donne ~1985
Uomini ~2510


Età mediana alla diagnosi

Donne 73
Uomini 71


Decessi all'anno

Donne ~725
Uomini ~905


Età alla diagnosi



Tasso di nuovi casi e di decessi per regione



Tasso di nuovi casi e di decessi da 1997



Tasso di sopravvivenza relativo a cinque anni dal 1996

