

Tumore della cervice uterina (ICD-10 C53)

in Svizzera

- Il tumore del collo dell'utero è il quarto tumore più comune nelle donne a livello globale.
- In Svizzera l'incidenza è più bassa (17° tumore più comune).
- Il tumore del collo dell'utero è causato dall'infezione persistente del papillomavirus umano (HPV).
- La vaccinazione profilattica contro l'HPV e lo screening e il trattamento delle lesioni precancerose sono strategie efficaci per prevenire il tumore del collo dell'utero.
- Il tumore del collo dell'utero può essere ben trattato e curato se diagnosticato in una fase precoce.

nuovi casi all'anno
(Incidenza)

~ 250


età mediana alla diagnosi

54


decessi all'anno
(Mortalità)

~ 75


Incidenza e mortalità nel tempo



Incidenza e mortalità per regione




Età alla diagnosi



- Ogni anno, a circa 250 donne in Svizzera viene diagnosticato il tumore della cervice uterina e circa 75 ne muoiono.
- Il tasso di nuovi casi e di mortalità è diminuito costantemente dagli anni Novanta.
- La sopravvivenza è migliorata: circa il 70% delle pazienti è ancora vivo 5 anni dopo la diagnosi.

Sopravvivenza relativa a cinque anni nel tempo



La sopravvivenza relativa stima la sopravvivenza dei pazienti oncologici rispetto alla popolazione generale.

Visitate il sito www.snrt.ch per ulteriori informazioni.

I dati presentati si riferiscono ai casi diagnosticati nel periodo 2017-2021, se non diversamente specificato. I tassi di incidenza e di mortalità sono standardizzati per età utilizzando lo standard europeo del 1976.